

Winfried van Blericq	Zahnarzt/Oralchirurg
Nikolai van Blericq	Zahnarzt/Oralchirurg
Dr. Marlitt van Blericq	Zahnärztin
Dr. Dennis Lang	Zahnarzt
Franz Köster	Zahnarzt

## Aufklärung und Einverständnis zur Behandlung in Sedierung mit Midazolam

Patient: \_\_\_\_\_ geb.: \_\_\_\_\_

Auf Ihren Wunsch hin wird ein oralchirurgischer Eingriff in Sedierung durchgeführt.

Hierzu wird Ihnen ein Beruhigungsmittel (Midazolam) in die Vene verabreicht. Midazolam ist ein **angstlösendes** und **beruhigendes** Medikament, welches dem Patienten helfen kann den Behandlungsstress sowie die Behandlungsangst zu reduzieren. Der Patient ist während der Sedierung wach und ansprechbar. Während des gesamten Eingriffs überwachen wir wichtige Vitalparameter wie die Herzfrequenz, den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung des Blutes.

### Was ist vor einer Behandlung in Sedierung zu beachten?

- Bitte geben Sie bei der Aufklärung unbedingt alle **Medikamente** an, die Sie einnehmen, damit wir klären können, ob es bei Ihnen evtl. eine **Kontraindikation** für eine Sedierung gibt.
- **Auf gar keinen Fall** dürfen **Beruhigungsmedikamente, Schlafmittel oder Antidepressiva** eingenommen werden, da diese sich unkontrollierbar mit Midazolam verstärken können. Dazu gehören auch **pflanzliche/homöopathische Mittel** wie **Baldrian** etc..
- Nehmen Sie am Tag der Sedierung **Medikamente**, die Sie gewohnheitsmäßig einnehmen, nach Rücksprache mit uns **wie gewohnt** ein.
- **6 Stunden vor der OP** müssen Sie **nüchtern** sein (nichts essen, nichts trinken, kein Kaugummi kauen und nicht rauchen!).
- **Keinen Nagellack/künstliche Fingernägel.**
- Zwingend eine **volljährige Person** für den **Heimweg** mitbringen.

### Was ist bei einer Behandlung in Sedierung zu beachten?

- Selten kann es zu einer **paradoxen Reaktion** kommen (der Patient reagiert mit Unruhe anstatt Beruhigung).
- Das Medikament kann zu einer **Atemdepression** und einem **Blutdruckabfall** führen.
- Im Bereich der Venenverweilkanüle für die Medikamentengabe kann es in seltenen Fällen zu einer **Venenentzündung, Nachblutung** und/oder **Gefäßverletzung** kommen.
- Nach einer Sedierung dürfen Sie **24h nicht selbständig am Straßenverkehr teilnehmen** und **24h kein KFZ** führen. Für den Nachhauseweg benötigen Sie zwingend eine volljährige Begleitung.
- Bis **24h** nach einer Sedierung sollten Sie **Zuhause nicht alleine** sein und auch nicht allein in einer Wohnung übernachten.

Hiermit bestätige ich, dass ich hinreichend über die Risiken einer Sedierung mit Midazolam auf-geklärt und alle meine Fragen hierzu beantwortet wurden. Ich habe keine weiteren Fragen.

\_\_\_\_\_  
Zahnarzt

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Patient/in